

Thème : Suites vectorielles et familles sommables

EXERCICE 1

Spectre d'un élément d'une algèbre et compacité

📖 Titre : Spectre d'un élément d'une algèbre et compacité

🔖 ID : 264 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 250

★ Difficulté :



Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre normée de dimension finie. On note e son élément neutre pour la multiplication et $\mathcal{U}(\mathcal{A})$ l'ensemble de ses inversibles. Soit $a \in \mathcal{A}$. On appelle valeur spectrale de a tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $a - \lambda e$ n'est pas inversible. On note $\text{Sp}(a)$ l'ensemble des valeurs spectrales de a .

1. Démontrer que $\forall \lambda \in \text{Sp}(a), |\lambda| \leq \|a\|$
2. Démontrer que $\mathcal{U}(\mathcal{A})$ est un ouvert de $\mathcal{A}$.
3. Démontrer que $\text{Sp}(a)$ est un compact de $\mathcal{A}$.

EXERCICE 2

$\exp(A)$ est un polynôme en A

📖 Titre : $\exp(A)$ est un polynôme en A

🔖 ID : 265 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 251

★ Difficulté :



Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Démontrer qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\exp(A) = P(A)$

EXERCICE 3

Calcul de $\exp(A)$ dans des cas particuliers intéressants

📖 Titre : Calcul de $\exp(A)$ dans des cas particuliers intéressants

🔖 ID : 266 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 252

★ Difficulté :



Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Déterminer $\exp(A)$ dans chacun des cas suivants :

1. A est la matrice d'un projecteur, c'est-à-dire $A^2 = A$.
2. A est la matrice d'une symétrie vectorielle, c'est-à-dire $A^2 = I_n$.
3. A est la matrice dont tous les coefficients valent 1.

EXERCICE 4

Surjectivité de $\exp$ pour le cas de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

📖 Titre : Surjectivité de $\exp$ pour le cas de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

🔖 ID : 267 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 253

★ Difficulté :



1. (a) Démontrer que :

$$\forall w \in \mathbb{C}^*, \exists z \in \mathbb{C}, \exp(z) = w.$$

(b) Que peut on dire de $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ si $\exp(z_1) = \exp(z_2)$?

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices tel qu'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $B = P^{-1}AP$. Démontrer qu'il existe $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $B = Q^{-1}AQ$. On exprime ça en disant que deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- (d) Soit $z = a + ib \in \mathbb{C}$. Démontrer que les matrices $M = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
2. (a) Soit $A \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que A est diagonalisable. Démontrer que :
- $$\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \exp(B) = A.$$
- (b) Soit $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathcal{S} = \{\alpha I_2 + \beta N / (\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2\}$. Démontrer que $\mathcal{S}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et que $\forall M \in \mathcal{S}, \exp(M) \in \mathcal{S}$.
- (c) En déduire que : $\forall A \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{C}), \exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}), \exp(B) = A$.
3. Soit $A \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ une matrice diagonalisable de valeurs propres λ_1 et λ_2 .
- (a) Démontrer que si $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$ alors $\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \exp(B) = A$.
- (b) Que peut-on dire si $\lambda_1 \lambda_2 < 0$.
- (c) Soit $K = \begin{pmatrix} 0 & -\pi \\ \pi & 0 \end{pmatrix}$. Diagonaliser K dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et en déduire que $\exp(K) = -I_2$.
- (d) En déduire que : $\forall \lambda \in \mathbb{R}^*, \exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \exp(B) = \lambda I_2$.
4. Soit $A \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ une matrice trigonalisable non diagonalisable. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à A .
- (a) Démontrer qu'il existe une base $\mathcal{C} = (V_1, V_2)$ de $\mathbb{R}^2$ tel que la matrice T de u relativement à $\mathcal{C}$ est de la forme $T = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ où $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^*$.
- (b) Démontrer que si $\lambda > 0$ alors $\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \exp(B) = A$.
- (c) On suppose que $\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \exp(B) = A$ et on note v l'endomorphisme canoniquement associé à B . Montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $v(V_1) = \alpha V_1$.
- (d) Déduire de ce qui précède que l'on a :
- $$\exists B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \exp(B) = A \Leftrightarrow \lambda > 0.$$
5. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $\text{Sp}(A) = \emptyset$.
- (a) Justifier pourquoi A est inversible.
- (b) Démontrer que A est semblable, dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, à une matrice de la forme $\exp(\Delta)$ avec $\Delta = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \bar{\lambda} \end{pmatrix}$ tel que $\lambda \in \mathbb{C}$.
- (c) Démontrer que Δ est semblable, dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ à une matrice de la forme $B = rR_\theta$ avec $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ et $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.
- (d) En déduire qu'il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $\exp(M) = A$.

EXERCICE 5

Conditions sur un compact de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ pour qu'il soit un groupe

■ **Titre :** Conditions sur un compact de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ pour qu'il soit un groupe

🔑 **ID :** 268 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | N° : 254

★ **Difficulté :**
★★★★★

Soit K une partie compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que :

$$\begin{cases} (i) & K \subset \mathbf{GL}_n(\mathbb{C}) \\ (ii) & \forall A, B \in K, AB \in K \end{cases}$$

Montrer que K est un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$.

Indication : Commencer par prouver que $I_n \in K$.

EXERCICE 6

Exponentielle et similitude

📖 Titre : Exponentielle et similitude

🔖 ID : 269 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 255

★ Difficulté :



n est un entier naturel non nul et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Démontrer que si A et B sont semblables alors il en est de même de $P(A)$ et $P(B)$, pour tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$. En déduire que $\exp(A)$ et $\exp(B)$ sont semblables.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices tel qu'il existe $P \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $B = P^{-1}AP$. Démontrer qu'il existe $Q \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ tel que $B = Q^{-1}AQ$. On exprime ça en disant que deux matrices réelles semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont semblables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit $A \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ tel que A n'a aucune valeur propre réelle. Démontrer qu'il existe $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que : $\exp(B) = A$.

EXERCICE 7

Exponentielles de matrices importantes de taille 2

📖 Titre : Exponentielles de matrices importantes de taille 2

🔖 ID : 270 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 256

★ Difficulté :



Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$:

$$A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B_\theta = \begin{pmatrix} i\theta & 0 \\ 0 & -i\theta \end{pmatrix}.$$

1. Prouver que A_θ et B_θ sont semblables dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
2. Comment déterminer le plus rapidement possible une matrice $P \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{C})$ tel que la relation :

$$A_\theta = PB_\theta P^{-1}$$

soit vérifiée ?

3. Calculer $\exp(A_\theta)$.
4. Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $M = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Calculer $\exp(M)$.

EXERCICE 8

Contre-exemple anti fubini

📖 Titre : Contre-exemple anti fubini

🔖 ID : 271 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 257

★ Difficulté :



On considère la suite double $(u_{n,p})$ définie par : $u_{n,p} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = p \\ 0 & \text{si } n > p \\ -\frac{1}{2^{p-n}} & \text{si } n < p \end{cases}$

1. Calculer $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$
2. Calculer $\sum_{p=0}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_{n,p} \right)$
3. Que remarquez vous ? Explication ?

EXERCICE 9

zeta, zeta alternée et autres choses

📖 **Titre :** zeta, zeta alternée et autres choses

🔑 **ID :** 272 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 258

★ **Difficulté :**



On donne pour tout nombre réel x tel que $x > 1$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ et $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} (H_n - \ln(n))$ où $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la suite double $(u_{n,k})_{\substack{n \geq 2 \\ k \geq 2}}$ définie par $u_{n,k} = \frac{(-1)^k}{kn^k}$

1. Montrer que $(u_{n,k})$ est sommable.
2. En déduire que $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \zeta(k) = \gamma$.

EXERCICE 10 Une famille sommable non ordinaire

📖 **Titre :** Une famille sommable non ordinaire

🔑 **ID :** 273 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 259

★ **Difficulté :**



Soit λ un nombre réel tel que $0 < \lambda < 1$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer la somme : $\sum_{k=n}^{+\infty} \binom{k}{n} (1-\lambda)^{k-n}$.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite sommable. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $v_n = \sum_{k=n}^{+\infty} \binom{k}{n} (1-\lambda)^{k-n} \lambda^k u_k$. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable et calculer sa somme.

EXERCICE 11 Produit de convolution dans $\ell^1(\mathbb{Z})$

📖 **Titre :** Produit de convolution dans $\ell^1(\mathbb{Z})$

🔑 **ID :** 274 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 260

★ **Difficulté :**



On note $\ell^1(\mathbb{Z})$ l'ensemble des familles de nombres complexes $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ qui sont sommables. On définit sur $\ell^1(\mathbb{Z})$ une norme en posant $\|u\|$ la somme de la famille $(|u_n|)_{n \in \mathbb{Z}}$

1. Soit $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la famille $(u_k v_{n-k})_{k \in \mathbb{Z}}$ est sommable.
2. Pour $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, on définit la famille $u \star v$ par $(u \star v)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k}$ où $n \in \mathbb{Z}$. Démontrer que $u \star v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, puis calculer $\|u \star v\|$ en fonction de $\|u\|$ et de $\|v\|$
3. Démontrer que la loi $\star$ agissant sur $\ell^1(\mathbb{Z})$ est une loi associative, commutative, et possédant un élément neutre.
4. On définit $u \in \ell^1(\mathbb{Z})$ par $u_0 = 1, u_1 = -1$ et $u_n = 0$ sinon. Démontrer que u n'est pas inversible dans $\ell^1(\mathbb{Z})$ pour $\star$

EXERCICE 12 Une famille sommable de nombres complexes

📖 **Titre :** Une famille sommable de nombres complexes

🔑 **ID :** 275 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 261

★ **Difficulté :**



Soient $r \in [0; 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Justifier l'existence et calculer

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta}$$

EXERCICE 13**Une autre famille de nombres complexes**

📖 **Titre :** Une autre famille de nombres complexes

🔖 **ID :** 276 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 262

★ **Difficulté :**



Convergence et calcul, pour z complexe tel que $|z| < 1$, de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2^n}}{1 - z^{2^{n+1}}}$$

EXERCICE 14**Une famille de réels positifs construite à l'aide d'une permutation**

📖 **Titre :** Une famille de réels positifs construite à l'aide d'une permutation

🔖 **ID :** 277 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 263

★ **Difficulté :**



Soit σ une permutation de $\mathbb{N}^*$. Quelle est la nature de

$$\sum \frac{\sigma(n)}{n^2 \ln n}?$$

EXERCICE 15**Exemples de familles doubles**

📖 **Titre :** Exemples de familles doubles

🔖 **ID :** 278 ⌚ **Durée :** —

📖 **Niveau :** L2 | **N° :** 264

★ **Difficulté :**



1. Soit s un nombre réel tel que $s \geq 1$
 - (a) Démontrer que pour tout nombre réel x positif, on a : $(1+x)^s \geq 1+sx$.
 - (b) Prouver que la fonction $t \mapsto t^s$ est convexe sur $]0, +\infty[$.
 - (c) En déduire que pour tous nombre réels strictement positifs x et y , on a :

$$2^{1-s}(x+y)^s \leq x^s + y^s.$$

2. Soit α un nombre réel et on considère la famille $a = (a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$\forall (p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, a_{p,q} = \frac{1}{(p+q)^\alpha}.$$

- (a) Démontrer que si $\alpha \leq 1$ alors la famille a n'est pas sommable.
 - (b) Démontrer que la famille a est sommable si et seulement si $\alpha > 2$.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha > 1$ et on considère la famille $(b_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ tel que :

$$\forall (p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, b_{p,q} = \frac{1}{p^\alpha + q^\alpha}.$$

- (a) Démontrer que :

$$\forall p,q \in \mathbb{N}^*, 2^{1-\alpha}(p+q)^\alpha \leq p^\alpha + q^\alpha \leq (p+q)^\alpha$$
 - (b) En déduire que la famille b est sommable si et seulement si $\alpha > 2$.
4. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ et pour tout $(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, on pose $c_{p,q} = \frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}$. Démontrer que la famille $(c_{p,q})$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

EXERCICE 16**La série $\sum d(n)x^n$ avec $d(n) = \text{card}'\{k \in \mathbb{N}/k|n\}$**

📖 **Titre :** La série $\sum d(n)x^n$ avec $d(n) = \text{card}'\{k \in \mathbb{N}/k|n\}$
 💎 **ID :** 279 ⌚ **Durée :** —
 ⓘ **Niveau :** L2 | N° : 265

★ **Difficulté :**
 ★ ★ ★ ★ ★

Soit $x \in]-1, [1$. Démontrer que la famille $(x^{kl})_{(k,n) \in (\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable. 2. En déduire que

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{1-x^k} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)x^n$$

où $d(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n .

EXERCICE 17

Calcul de la somme d'une série en utilisant le produit

📖 **Titre :** Calcul de la somme d'une série en utilisant le produit
 💎 **ID :** 280 ⌚ **Durée :** —
 ⓘ **Niveau :** L2 | N° : 266

★ **Difficulté :**
 ★ ★ ★ ★ ★

Pour $n \geq 0$, on pose :

$$w_n = 2^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{4^k}{k!}.$$

1. Montrer que la série de terme général w_n converge.
2. Calculer sa somme en utilisant le produit d'une série géométrique par une autre série classique.

EXERCICE 18

Produits de Cuchy, exemples

📖 **Titre :** Produits de Cuchy, exemples
 💎 **ID :** 281 ⌚ **Durée :** —
 ⓘ **Niveau :** L2 | N° : 267

★ **Difficulté :**
 ★ ★ ★ ★ ★

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tels que $|a| < 1$ et $|b| < 1$. Prouver que

$$\begin{cases} \frac{1}{(1-a)(1-b)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} \text{ si } a \neq b \\ \frac{1}{(1-a)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n \text{ si } a = b \end{cases}$$

EXERCICE 19

Une famille sommable pas facile

📖 **Titre :** Une famille sommable pas facile
 💎 **ID :** 282 ⌚ **Durée :** —
 ⓘ **Niveau :** L2 | N° : 268

★ **Difficulté :**
 ★ ★ ★ ★ ★

On considère $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites positives, telles que $\sum a_n^2$ et $\sum b_n^2$ convergent. Prouver que $\sum_n \sum_p \frac{a_n b_p}{n+p}$ converge.

INDICATION : On montrera la lemme suivant : $\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{m}}{(m+k)\sqrt{k}} \leq \pi$ pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$.

EXERCICE 20

Suites doubles, exemples

📖 Titre : Suites doubles, exemples

🔑 ID : 283 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 269

★ Difficulté :



Pour tout $(n, p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, on pose $u_{n,p} = \begin{cases} \frac{(-1)^p}{p^2} & \text{si } p \geq n > 0 \\ 0 & \text{si } 1 \leq p < n \end{cases}$

1. Est ce que la suite double $(u_{n,p})$ est sommable ?
2. Étudier l'existence des sommes $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{p=1}^{+\infty} u_{n,p} \right)$ et $\sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} u_{n,p} \right)$, et en cas d'existence, les comparer.

EXERCICE 21

Somme double avec cos

📖 Titre : Somme double avec cos

🔑 ID : 284 ⌚ Durée : —

📖 Niveau : L2 | N° : 270

★ Difficulté :



Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer la somme $\sum_{p,q \geq 0} \frac{\cos((p+q)\theta)}{p!q!}$.